

# 外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	克菌寧潔淨液 0.5%	申請廠商	寶齡富錦生科技股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字第 044025 號		

## 克菌寧潔淨液 0.5%

### Easy Antiseptic Cleansing Solution 0.5%

**【作用說明】**

本品為一消毒殺菌劑，可迅速而有效的對抗細菌，其作用範圍廣泛，包括革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌，如綠膿桿菌等。本品可預防皮膚感染，進而減少交叉感染之危險。

**【成分】** 每 mL 中含：

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate 20%.....25 mg

(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....5 mg)

其他成分（賦形劑）：Propylene Glycol、Cocamide Diethanolamine、Cocamidopropyl Betaine、Fragrance、Ponceau 4R、Isopropyl Alcohol、Lactic Acid、Purified Water。

**【用途(適應症)】** 一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

**【使用上注意事項】**

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 3 歲以下。
  2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量或使用次數。
  4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
  5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
  7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
  8. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，本藥勿使用於大面積之體表（以使用者的兩手掌面積為參考）。
  9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  10. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。
  11. 使用前請混搖均勻。
  12. 請勿和非離子界面活性劑及陰離子等物質（如氯離子、碘化鉀）併用，因會降低本藥效用。

**【用法用量】** 塗於患部。

**【使用方法】**

皮膚創傷及一般皮膚之清潔：	以清水濕潤患部後，取適量本品清洗，再以清水充分沖洗。若傷口深及皮膚深部者不適用本品。除非於特殊情況下，本品不建議長期重複使用於清潔廣大面積之肌膚。
手術前之皮膚清潔	取適量以消毒海綿塗擦於所須之部位，停留 2 分鐘後，以消毒手巾擦乾，重複上述步驟一次。
開刀之刷手清潔	濕潤手部及前臂，以 5mL 本品刷洗三分鐘後，特別注意指甲、指間之清潔，以水沖洗後，重複上述步驟一次，以消毒手巾擦乾。
個人居家清潔	以溫水濕潤手部後，取 5mL 本品清潔 15 秒後，再以清水充分沖洗後擦乾。

**【警語】**

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。
2. 使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

**【包裝】** 4000 mL 以下塑膠瓶裝。

**【儲存】** 25°C 以下儲存。

**【類別】** 醫師藥師藥劑生指示藥品


衛署藥製字第 044025 號 GMP G-7265

藥 商：寶齡富錦生科技股份有限公司

地 址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製 造 廠：寶齡富錦生科技股份有限公司 平鎮廠

廠 址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



107. 12. 06

※ 外：

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

(1)報核仿單標籤  
註 (2)仿單標籤等實  
粘貼時附送現


成分：每 mL 含  
有效成分及含量：  
Chlorhexidine Gluconate  
20%.....25 mg  
(eq. to Chlorhexidine  
Gluconate.....5 mg)  
其他成分（賦形劑）：Propylene  
Glycol、Cocamide Diethanolamine、  
Cocamidopropyl Betaine、  
Fragrance、Ponceau 4R、Isopropyl  
Alcohol、Lactic Acid、Purified  
Water。  
用途（適應症）：一般外用消毒劑，  
可當作初步傷口處理。  
不得使用族群：曾因本藥成分引起  
過敏的人。  
用法用量：塗於患部。  
類別：醫師藥師藥劑生指示藥品  
諮詢專線：02-26558218  
包裝：4000 mL 以下塑膠瓶裝。  
儲存：25°C 以下儲存。  
衛署藥製字第 044025 號  
GMP G-7265



使用方法：  
•皮膚創傷及一般皮膚之清潔：以  
清水濕潤患部後，取適量本品清  
洗，再以清水充分沖洗。若傷口  
深及皮膚深部者不適用本品。除  
非於特殊情況下，本品不建議長  
期重複使用於清潔廣大面積之肌  
膚。  
•手術前之皮膚清潔：取適量以消  
毒海綿塗擦於所須之部位，停留  
2 分鐘後，以消毒手巾擦乾，重  
複上述步驟一次。  
•開刀之刷手清潔：濕潤手部及前  
臂，以 5mL 本品刷洗三分鐘後，  
特別注意指甲、指間之清潔，以  
水沖洗後，重複上述步驟一次，  
以消毒手巾擦乾。  
•個人居家清潔：以溫水濕潤手部  
後，取 5mL 本品清潔 15 秒後，  
再以清水充分沖洗後擦乾。

批號/製造日期/保存期限：

藥商：寶齡富錦生科技股份有限公司  
地址：台北市南港區園區街 3 號  
16 樓  
製造廠：寶齡富錦生科技股份有限公司  
平鎮廠  
廠址：桃園市平鎮區興隆路 266  
號



外用

克菌寧潔淨液  
0.5%

Easy Antiseptic  
Cleansing Solution  
0.5%

107. 12. 06

克菌寧潔淨液 0.5%

Easy Antiseptic Cleansing Solution 0.5%

外用

【成分】每 mL 含

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate 20%.....25 mg  
(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....5 mg)

其他成分（賦形劑）：Propylene Glycol、Cocamide Diethanolamine、Cocamidopropyl Betaine、  
Fragrance、Ponceau 4R、Isopropyl Alcohol、Lactic Acid、Purified Water。

【用途（適應症）】一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】塗於患部。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】02-26558218

【使用方法】

- 皮膚創傷及一般皮膚之清潔：以清水濕潤患部後，取適量本品清洗，再以清水充分沖洗。若傷口深及皮膚深部者不適用本品。除非於特殊情況下，本品不建議長期重複使用於清潔廣大面積之肌膚。
- 手術前之皮膚清潔：取適量以消毒海綿塗擦於所須之部位，停留 2 分鐘後，以消毒手巾擦乾，重複上述步驟一次。
- 開刀之刷手清潔：濕潤手部及前臂，以 5mL 本品刷洗三分鐘後，特別注意指甲、指間之清潔，以水沖洗後，重複上述步驟一次，以消毒手巾擦乾。
- 個人居家清潔：以溫水濕潤手部後，取 5mL 本品清潔 15 秒後，再以清水充分沖洗後擦乾。

【包裝】4000 mL 以下塑膠瓶裝。

【批號/製造日期/保存期限】

【儲存】25°C 以下儲存。

衛署藥製字第 044025 號 GMP G-7265

藥商：寶齡富錦生科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠：寶齡富錦生科技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號

