

外盒、仿單、標籤粘貼表

橘色

產品名稱	克菌寧殺菌液 2%	申請廠商	寶齡富錦生技股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字第 052435 號	110. 2. 25	

克菌寧殺菌液 2% Easy Antiseptic Liquid 2%

橘色

(2% w/v Chlorhexidine Gluconate in 75% v/v Alcohol)

【成分】每 mL 中含：

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v).....0.1 mL

(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)

其他成分（賦形劑）：

Ethanol (Alcohol)、Lactic Acid、Quinoline Yellow、D&C Red No.33、Purified Water。

【用途(適應症)】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3 歲以下。
 2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量或使用次數。
 4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
 5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
 7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
 8. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，本藥勿使用於大面積之體表（以使用者的兩手掌面積為參考）。
 9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 10. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。
 11. 本藥係以酒精為基劑，應避開火源。
 12. 不可與清潔劑或其他化學藥品混合。
 13. 若有非離子界面活性劑及陰離子等物質存在(如氯離子、碘化鉀)會降低 Chlorhexidine 效用，而導致抗菌能力下降，請勿與此類產品併用。

【用法用量】使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
若有上述外之其他不適情況產生。

【包裝】4000 毫升以下 HDPE 塑膠瓶裝

【儲存】25°C 以下儲存

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 052435 號 GMP G-10846

藥商：寶齡富錦生技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



※ 外文仿單應檢附中文譯文

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

貼全形實物為原則。
大或印於玻璃金屬容器
將照相影本代替粘貼報材

外用

克菌寧 殺菌液 2% Easy Antiseptic Liquid 2%

(2% w/v Chlorhexidine
Gluconate in 75% v/v Alcohol)

橘色

【成分】每 mL 中含：
有效成分及含量：
Chlorhexidine Gluconate Solution
20% (w/v).....0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine
Gluconate.....20 mg)
其他成分（賦形劑）：
Ethanol (Alcohol)、Lactic Acid、
Quinoline Yellow、D&C Red
No.33、Purified Water。
【用途(適應症)】手術前手部消
毒、病房手部消毒、病人手術前
皮膚消毒。
【不得使用族群】曾因本藥成分
引起過敏的人。
【用法用量】使用時不用稀釋。
皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮
膚上，待乾燥。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥
品
【諮詢專線】02-26558218

【包裝】4000 毫升以下 HDPE 塑
膠瓶裝

【批號/製造日期/保存期限】

【儲存】25°C 以下儲存。

衛署藥製字第 052435 號
GMP G-10846

藥商：寶齡富錦生技股份有限公
司
地址：台北市南港區園區街 3 號
16 樓
製造廠：寶齡富錦生技股份有限
公司 平鎮廠
廠址：桃園市平鎮區興隆路 266
號



110. 2. 25

克菌寧殺菌液 2% Easy Antiseptic Liquid 2%

(2% w/v Chlorhexidine Gluconate in 75% v/v Alcohol)

外用

橘色

【成分】每 mL 中含：
有效成分及含量：
Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v).....0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)
其他成分（賦形劑）：
Ethanol (Alcohol)、Lactic Acid、Quinoline Yellow、D&C Red No.33、Purified Water。
【用途(適應症)】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。
【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。
【用法用量】使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢專線】02-26558218
【包裝】4000 毫升以下 HDPE 塑膠瓶裝
【批號/製造日期/保存期限】
【儲存】25°C 以下儲存。

衛署藥製字第 052435 號 GMP G-10846
藥商：寶齡富錦生技股份有限公司
地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓
製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠
廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



QR Code 內容完整版(橘色)

品名：克菌寧殺菌液 2% (橘色) Easy Antiseptic Liquid 2%

用途 (適應症)：手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

用法用量：使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用，塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

藥品劑型：外用液劑。

諮詢電話：02-26558218