

# 外盒、仿單、標籤粘貼表

粉紅色

產品名稱	克菌寧殺菌液 2%	申請廠商	寶齡富錦生技股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字第 052435 號		

## 克菌寧殺菌液 2%

### Easy Antiseptic Liquid 2%

(2% w/v Chlorhexidine Gluconate in 75% v/v Alcohol)

粉紅色

【成分】每 mL 中含：

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v).....0.1 mL

(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)

其他成分（賦形劑）：

Ethanol (Alcohol)、Lactic Acid、D&C Red No.33、Purified Water。

【用途（適應症）】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 3 歲以下。
  2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量或使用次數。
  4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
  5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
  7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
  8. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，本藥勿使用於大面積之體表（以使用者的兩手掌面積為參考）。
  9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  10. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。
  11. 本藥係以酒精為基劑，應避開火源。
  12. 不可與清潔劑或其他化學藥品混合。
  13. 若有非離子界面活性劑及陰離子等物質存在(如氯離子、碘化鉀)會降低 Chlorhexidine 效用，而導致抗菌能力下降，請勿與此類產品併用。

【用法用量】使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

若有上述外之其他不適情況產生。

【包裝】4000 毫升以下 HDPE 塑膠瓶裝

【儲存】25°C 以下儲存

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 052435 號 GMP G-10846

藥 商：寶齡富錦生技股份有限公司

地 址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製 造 廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠 址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



※ 外文仿單應檢附中譯文

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

110. 2. 25

貼全形實物為原則。  
大或印於玻璃金屬容器  
將照相影本代替粘貼報本

外用

【成分】每 mL 中含：  
有效成分及含量：  
Chlorhexidine Gluconate Solution  
20% (w/v).....0.1 mL  
(eq. to Chlorhexidine  
Gluconate.....20 mg)  
其他成分（賦形劑）：  
Ethanol (Alcohol)、Lactic Acid、  
D&C Red No.33、Purified Water。  
【用途(適應症)】手術前手部消毒、  
病房手部消毒、病人手術前  
皮膚消毒。  
【不得使用族群】曾因本藥成分  
引起過敏的人。  
【用法用量】使用時不用稀釋。  
皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮  
膚上，待乾燥。  
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥  
品  
【諮詢專線】02-26558218

【包裝】4000 毫升以下 HDPE 塑  
膠瓶裝

【批號/製造日期/保存期限】

【儲存】25°C 以下儲存。

衛署藥製字第 052435 號  
GMP G-10846

藥商：寶齡富錦生技股份有限公  
司  
地址：台北市南港區園區街 3 號  
16 樓  
製造廠：寶齡富錦生技股份有限  
公司 平鎮廠  
廠址：桃園市平鎮區興隆路 266  
號



克菌寧  
殺菌液 2%  
Easy Antiseptic  
Liquid 2%

(2% w/v Chlorhexidine  
Gluconate in 75% v/v Alcohol)

粉紅色



110. 2. 25

克菌寧殺菌液 2%  
Easy Antiseptic Liquid 2%

(2% w/v Chlorhexidine Gluconate in 75% v/v Alcohol)

外用

粉紅色

【成分】每 mL 中含：  
有效成分及含量：  
Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v).....0.1 mL  
(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)  
其他成分（賦形劑）：  
Ethanol (Alcohol)、Lactic Acid、D&C Red No.33、Purified Water。  
【用途(適應症)】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。  
【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。  
【用法用量】使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。  
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品  
【諮詢專線】02-26558218  
【包裝】4000 毫升以下 HDPE 塑膠瓶裝  
【批號/製造日期/保存期限】  
【儲存】25°C 以下儲存。

衛署藥製字第 052435 號 GMP G-10846

藥商：寶齡富錦生技股份有限公司  
地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓  
製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠  
廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



## QR Code 內容 完整版 (粉紅色)

品名：克菌寧殺菌液 2% (粉紅色) Easy Antiseptic Liquid 2%

用途 (適應症)：手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

用法用量：使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用，塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

藥品劑型：外用液劑。

諮詢電話：02-26558218