


外盒、仿單、標籤粘貼表

無色

產品名稱	克菌寧殺菌水溶液 2%	申請廠商	牛耳國際生技有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字第 054991 號		



110. 7. 05

克菌寧殺菌水溶液 2%

無色

Aqua Easy Antiseptic Solution 2%

【成分】每 mL 中含：

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v).....0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)

其他成分（賦形劑）：Purified Water。

【用途(適應症)】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3 歲以下。
 2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量或使用次數。
 4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
 5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
 7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
 8. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，本藥勿使用於大面積之體表（以使用者的兩手掌面積為參考）。
 9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 10. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。
 11. 若有非離子界面活性劑及陰離子等物質存在(如氯離子、碘化鉀)會降低 Chlorhexidine 效用，而導致抗菌能力下降，請勿與此類產品併用。

【用法用量】

使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
若有上述外之其他不適情況產生。

【包裝】4000 毫升以下塑膠瓶裝。

【儲存】25°C 以下儲存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 054991 號 GMP G-10986

委託者：牛耳國際生技有限公司

地址：台北市大安區信義路四段 1 號 4 樓之 7

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



(1)報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

(2)仿單標籤等應以放大或印於玻璃金屬容器等工價於

照相影本代替粘貼報核

外用
克菌寧殺菌水
溶液 2%
Aqua Easy
Antiseptic
Solution 2%

無色

【成分】每 mL 中含：
有效成分及含量：
Chlorhexidine Gluconate Solution
20% (w/v).....0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine
Gluconate.....20 mg)
其他成分（賦形劑）：Purified
Water。

【用途（適應症）】
手術前手部消毒、病房手部消
毒、病人手術前皮膚消毒。
【不得使用族群】曾因本藥成分
引起過敏的人。

【用法用量】
使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌
用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥
品


【諮詢專線】02-26558218

【包裝】4000 毫升以下塑膠瓶裝

【儲存】25°C 以下儲存。

【批號/製造日期/保存期限】

衛署藥製字第 054991 號
GMP G-10986
委託者：牛耳國際生技有限公司
地址：台北市大安區信義路四段 1
號 4 樓之 7
製造廠：寶齡富錦生技股份有限
公司 平鎮廠
廠址：桃園市平鎮區興隆路 266
號



110. 7. 05

克菌寧殺菌水溶液 2%
Aqua Easy Antiseptic Solution 2%

無色

外用

【成分】每 mL 中含：

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v)....0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)

其他成分（賦形劑）：Purified Water。

【用途（適應症）】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人
手術前皮膚消毒。

【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量
於皮膚上，待乾燥。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】02-26558218

【儲存】25°C 以下儲存。

【包裝】4000 毫升以下塑膠瓶裝

【批號/保存期限】

衛署藥製字第 054991 號 GMP G-10986

委託者：牛耳國際生技有限公司

地址：台北市大安區信義路四段 1 號 4 樓之 7

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠


廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



外盒、仿單、標籤粘貼表

無色

產品名稱	克菌寧殺菌水溶液 2%	申請廠商	牛耳國際生技有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字第 054991 號		



封面頁

110. 7. 05

外用

無色

Aqua Easy 2% Antiseptic Solution 克菌寧殺菌水溶液

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第 054991 號
GMP G-10986
批號/製造日期/保存期限

用途(適應症)
手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。
用法用量
使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。
製造廠
寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠



可撕開

內一頁

【成分】每 mL 中含：

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v).....0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)

其他成分 (賦形劑)： Purified Water。

【用途(適應症)】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

【不得使用者】曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】02-26558218

【使用上注意事項】

● 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

● 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1.3 歲以下。
2.有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

● 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

● 其他使用上注意事項：

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2.避免陽光直射。
- 3.勿超過建議使用量或使用次數。
- 4.使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
- 5.使用本藥前後應徹底洗淨雙手。



內二頁

6.本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

7.請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。

8.除非有醫師、藥師、藥劑生指示，本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。

9.使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

10.避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

11.若有非離子界面活性劑及陰離子等物質存在(如氯離子、碘化鉀)會降低 Chlorhexidine 效用，而導致抗菌能力下降，請勿與此類產品併用。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治；若有上述外之其他不適情況產生。

【包裝】4000 毫升以下塑膠瓶裝。

【儲存】25°C 以下儲存。

委託者：牛耳國際生技有限公司

地址：台北市內湖區行愛路 77 巷 67 號 7 樓

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號