

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“寶齡”易麻寧抑菌凝膠	申請廠商	寶齡富錦生技股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛部藥製字第 060916 號		

110. 8. 02

“寶齡”易麻寧抑菌凝膠

Easy Anaesthetic Bacteriostatic & Lubricating Gel

【成分】

Each mL Contains :

Lidocaine Hydrochloride.....20mg

Chlorhexidine Gluconate Solution 20%w/v..... 2.5mg

(eq. to Chlorhexidine gluconate.....0.5mg)

【賦形劑】

Methyl Paraben、Propyl Paraben、Hydroxyethyl Cellulose、

Propylene Glycol、Sodium Hydroxide、Purified Water。

【適應症】對粘膜具有潤滑、局部麻醉和消毒作用。

【用法用量】必要時，以適量塗抹之。本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 曾對局部麻醉劑過敏者，禁用本品。

2. 過量或使用間隔時間過短則可能引起血中濃度過高或引發

副作用，如 CNS 抑制、嗜睡、蕁麻疹、水腫等。

【儲存條件】儲存於 25℃ 以下。

【開封後之保存方式及使用期限】室溫，一個月。

【包裝】1000 公克以下 PE 積層鋁塑軟管裝。

限由醫師使用

衛部藥製字第 060916 號 GMP G-13709

藥商：寶齡富錦生技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

(1)報核仿單標籤以
(2)仿單標籤等實物過
粘貼時附送現品並

“寶齡”
易麻寧抑菌凝膠
Easy Anaesthetic
Bacteriostatic &
Lubricating Gel

外用

具有局部麻醉和消毒作用

【成分】
Each ml Contains :
Lidocaine
Hydrochloride...20mg
Chlorhexidine Gluconate
Solution 20%w/v.....2.5mg
(eq. to Chlorhexidine
gluconate.....0.5mg)

【適應症】
對粘膜具有潤滑、局部麻醉和
消毒作用。

【用法用量】必要時，以適量
塗抹之。本藥限由醫師使用。

【注意事項】請詳閱說明書。

【儲存條件】儲存於 25℃ 以
下。

【批號/製造日期/保存期限】

“寶齡”
易麻寧抑菌凝膠
Easy Anaesthetic
Bacteriostatic &
Lubricating Gel

外用

【包裝】1000 公克以下 PE
積層鋁塑軟管裝。

限由醫師使用

衛部藥製字第 060916 號
GMP G-13709

藥商：寶齡富錦生技股份有
限公司
地址：台北市南港區園區街
3 號 16 樓
製造廠：寶齡富錦生技股份
有限公司 平鎮廠
廠址：桃園市平鎮區興隆路
266 號



外用

“寶齡”易麻寧抑菌凝膠
Easy Anaesthetic Bacteriostatic & Lubricating Gel
局部麻醉
消毒作用

【成分】

Each ml Contains :

Lidocaine Hydrochloride.....20mg
Chlorhexidine Gluconate Solution 20%w/v.....2.5mg
(eq. to Chlorhexidine gluconate.....0.5mg)

【適應症】對粘膜具有潤滑、局部麻醉和消毒作用。

【用法用量】必要時，以適量塗抹之。本藥限由醫師使用。

【注意事項】請詳閱說明書。

【儲存條件】儲存於 25℃ 以下。

【包裝】1000 公克以下 PE 積層鋁塑軟管裝。

【批號/保存期限】

限由醫師使用

衛部藥製字第 060916 號 GMP G-13709

藥商：寶齡富錦生技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

110. 8. 02